



Keine Pigmentierung möglich

- Während der Schwangerschaft
- Bei stark blutverdünnenden Medikamenten. Sie können mit Ihrem Arzt besprechen, ob Sie es für eine kurze Zeit absetzen können.
- Bereiche, die mit Ekzemen betroffen sind

Vorsorge für ein bestes Ergebnis

- 72 Stunden vorher kein Aspirin, Ibuprofen oder Blutverdünner, es sei denn, dies ist medizinisch erforderlich. Paracetamol ist erlaubt.
- Einen Tag vorher & nachher keinen Kaffee, Alkohol oder energetisierende Getränke. So minimieren Sie Blutungen oder Schwellungen nach dem Eingriff.
- 30 Tage kein intensives UV-Licht wie Solarium & Sonnenbaden.
- 72 Stunden vorher keine Augenbrauen zupfen oder färben. Zupfen nach mindestens 14 Tagen, färben nach 30 Tagen.
- Keine chemischen Peelings, Mikrodermabrasion, Mesotherapie oder andere intensive Behandlungen, die eine schnellere Hauterneuerung verursachen und Behandlungen die 3 - 4 Wochen vor dem Eingriff Hautreizungen verursachen.
- Waschen Sie Ihre Haare vor dem Eingriff

Eyelinier-Pigmentierung

- Falls Sie Herpes-simplex-Viren in sich tragen, kann vor allem in der Heilphase einer Lippen-Pigmentierung, beginnend meistens am 3 Tag, Lippenherpes auftreten. Sie können Ihren Arzt nach präventiven Möglichkeiten fragen wie z. B. Aciclovir oder Ihr Immunsystem stärken.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Lippe weich und nicht spröde ist. Bei spröden Lippen kann das Pigment nicht eingebracht werden. Sie können daher vorab ein Lippenpeeling machen.

Eyelinier-Pigmentierung

- Nehmen Sie vor der Behandlung Ihre Kontaktlinsen raus.
- 72 Stunden vorher keine Wimpern färben.
- Wachstumsserum 14 Tage vorher pausieren.

Brauen-Pigmentierung

- 72 Stunden vorher keine Augenbrauen zupfen oder färben. Zupfen nach mindestens 14 Tagen, färben nach 30 Tagen.
- Wachstumsserum 14 Tage vorher pausieren.

